

نکات زیر در مورد مصرف داروها باید مورد توجه بیماران عزیز قرار گیرد :

- ❖ برای جلوگیری از عوارض داروها و تاثیر داروهای تجویزی داروها را به موقع و به میزان تجویز شده توسط پزشک مصرف نمایند و از مصرف خود سرانه هر دارو خودداری فرمایند.
- ❖ در صورت افت فشار خون حین دیالیز از مصرف داروهای پایین آورنده فشار خون 4 الی 8 ساعت قبل از دیالیز خودداری نمایید .
- ❖ کاپتوپریل و آتنولول حین دیالیز از صافی خارج می شوند لذا با کنترل فشار خون بعد از دیالیز، در صورت نیاز آنها را مصرف نمایید .

❖ داروهای آنتی بیوتیک را طبق دستور پزشک در فواصل زمانی معین مصرف کنید و دوره درمان را کامل کنید .

❖ نیاز به انسولین در بیماران دیالیزی کاهش می یابد. لذا جهت جلوگیری از افت قند خون حین دیالیز بیماران مبتلا به دیابت از تزریق انسولین و مصرف قرص های ضد قند خون در روز مراجعه به دیالیز خودداری نمایند.

❖ از مصرف خود سرانه داروهای مسکن خودداری نمایید .

❖ آسپرین را به علت افزایش خطر خونریزی خودسرانه مصرف نکنید.

- ❖ شربت های آنتی اسید را که برای کاهش میزان فسفر خون توسط پزشک تجویز می شود بیش از 2 هفته مصرف نکنید .
- ❖ فقط مجاز به مصرف شربت هیدروکسید آلومینیوم با تجویز پزشک هستید.
- ❖ از مصرف شربت های حاوی منیزیم خودداری فرمایید.
- ❖ شربت آنتی اسید را حین غذا یا بلافاصله بعد از غذا مصرف نمایید.
- ❖ داروی کربنات کلسیم اگر برای کاهش میزان فسفر خون توسط پزشک تجویز شده در حین غذا مصرف نمایید و اگر برای افزایش میزان کلسیم خون تجویز شده است بهتر است بعد از غذا مصرف شود.



مرکز آموزشی پژوهشی و خدمات درمانی سینا

مرکز آموزشی پژوهشی و خدمات درمانی سینا

راهنمای مصرف داروها

گردآوری: گروه آموزش دیالیز

تاریخ تدوین: 1398

تاریخ بازنگری: 1404

گروه هدف: بیماران دیالیزی

● آمپول ونوفر برای درمان کمبود آهن و درمان کم خونی در بیماران تجویز می شود.

● آمپول ونوفر پس از اتمام دیالیز داخل 100 سی سی سرم نمکی ریخته شده و بصورت آهسته تزریق شود.

● تمام داروهایی را که توسط سایر پزشکان تجویز شده است قبل از مصرف آنها با پزشک متخصص نفرولوژی مشورت نمایید. تمام داروهای مصرفی خود را جهت درج در پرونده به پرستار خود اطلاع دهید.

● فقط مجاز هستید از ویتامین های ب کمپلکس، اسید فولیک و ویتامین ث با نظر پزشک استفاده نمایید. از مصرف مولتی ویتامین و ویتامینهای گروه A و E (E) خودداری نمایید.

● آمپول اپرکس برای درمان کم خونی در بیماران دیالیزی تجویز می شود.

● آمپول اپرکس برای تاثیر بیشتر بهتر است به صورت زیر جلدی پس از اتمام دیالیز تزریق شود.

● اپرکس را در دمای 4-8 درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری نمایید.

● دارو باید از یخ زدگی و از نور مستقیم محافظت شود. و در زمان حمل و نقل در کنار یخ گذاشته شود. به هیچ وجه دارو را تکان ندهید.