

## لارنگوسکوپی:

### هدف از انجام لارنگوسکوپی:

بررسی تارهای صوتی و تمامی ساختمان حنجره از نظر عملکرد و وجود ضایعات .

### آمادگی قبل از لارنگوسکوپی:

- ۱- بیمار باید ناشتا بوده یا مصرف مایعات صاف ۲ ساعت قبل از عمل باشد .
- ۲- در صورت وجود بیماری های همراه (به خصوص بیماری های قلبی و آسم) حتما قبلا به پزشک معالج خود اطلاع دهد .
- ۳- بیمار در صورت داشتن دندان مصنوعی حتما آن را خارج نماید

### همکاری های لازم حین لارنگوسکوپی:

- ۱- پوزیشن عمل به صورت نشسته خواهد بود .
- ۲- قبل از معاینه از اسپری بی حس کننده لیدوکائین استفاده می گردد که وجود مزه تلخی در دهان نگران کننده نیست فقط آب دهان خود را قورت دهید .
- ۳- به هنگام معاینه توسط دستگاه احتمال تحریک و حالت تهوع و سرفه وجود خواهد داشت که سعی به همکاری نمایید .
- ۴- به هنگام معاینه زبان خود را تا حد ممکن از دهان خارج کنید و در این خصوص با پزشک معالج خود همکاری کنید .

### مراقبت بعد از لارنگوسکوپی

- ۱- مصرف مایعات صاف شده و غذا را دو ساعت بعد می توانید شروع کنید .
- ۲- در صورت برداشتن نمونه پیگیر جواب پاتولوژی خود باشید ۳- مختصری کرحتی در ناحیه حلق و زبان خود احساس خواهید کرد که تا حداقل یک ساعت بر طرف خواهد شد .

### عوارض جانبی:

احساس درد و ناراحتی مختصر که گذرا می باشد و نگران کننده نیست .

تهیه و تنظیم: رقیه اکبری راشد

واحد حد آموزش به بیمار مرکز آموزشی و درمانی سینا

اسفند ۱۳۹۶