

برداشتن ضایعات پوستی (لیپوم و ...):

تعریف لیپوم: توده های گنبدی شکل با مشخصه

اغلب نرم و قابل حرکت (معمولاً به قطر 2 تا

10 سانتیمتر).

اغلب خوش خیم و ندرتا بدخیم هستند . لیپومها

از سنین نوجوانی تا سالمندی در هر دو جنس و

بیشتر بین 40 تا 60 سالگی دیده میشوند.

تشخیص قطعی بدخیم یا خوش خیم بودن توده

فقط توسط پزشک معالج و نمونه گیری و

بررسی بافت (بیوپستی) امکانپذیر خواهد بود

برداشتن ضایعات پوستی (لیپوم و ...)

هر گونه تغییر رنگ با تغییر سایز در ضعیهت

پوستی نیاز به بررسی پزشکی دارند و نباید

نسبت به آنها بی توجه بود.

درمان:

عقیده غالب برآن است که لیپومها نیاز به درمان

ندارند اما در شرایطی که دردناک شده یا اندازه

آنها به حدی بزرگ شود که در عملکرد اندامها

اختلال ایجاد کند باید درمان شود.

مناسبتترین درمان برای این ضایعه های پوستی

جراحی است که اغلب با بی حسی موضعی انجام

خواهد شد.

ضایعه های پوستی در موارد زیر نیاز به جراحی

دارند.

- درد

- حساسیت

- التهاب

- وجود ترشحات در ضایعه

- افزایش اندازه

- قرار گرفتن ضایعه در مکانهای حساس برای

مثال مفاصل بین عضلات

- قرار گرفتن ضایعه با توده در مکانهایی که به

زیبایی چهره فرد لطمه بزند (پیشانی)

توجه:

در برخی موارد با تشخیص پزشک معالج نیاز به

اقداماتی مانند MRI میباشد.

اقدامات قبل از عمل جراحی:

1- بدلیل استفاده احتمالی از برخی تجهیزات

حساس لطفاً ناخنها فاقد لاک باشند.

2- زیورآلات فلزی قبل از ورود به اتاق عمل

خارج شود.

3- تا حد امکان رئی پوست ضایعه و اطراف آن

از موهای زاید پاک گردد.

4- در صورت استفاده از داروی خاص (

اسپیرین - هپارین - وارفارین - پلاویکس و ...

) حتماً پزشک معالج خود را مطلع سازید.

بیت الحرام



برداشتن ضایعات پوستی

تهیه و تنظیم :

مریم اصغری

کارشناس پرستاری

مسئول آموزش به بیماران

جراحی 3

اسفند 96

4- زمان حدودی کشیدن بخیه ها با تشخیص

پزشک معالج به قرار زیر میباشد:

- ناحیه صورت 3 تا 5 روز

- تنه 7 تا 10 روز

- دست و پا 11 تا 14 روز

در اندام انتهایی در صورت درد شدید و خواب
رفتگی (گزگز و مور مور شدن) به بیمارستان
مراجعه نمایید.

ناحیه جوش خوردن محل عمل (اسکار) به

مرور زمان کم خواهد شد ولی این مطلب به

معنی از بین رفتن کامل اسکار نمیباشد.

5- در صورت ابتلا به بیماریهای خاص خونی
مانند هیپاتیت و ... و یا حساسیت به داروی خاص
مانند پنی سیلین یا سابقه عمل جراحی در گذشته ،
حتما پزشک معالج را در جریان قرار دهید.

اقدامات پس از عمل جراحی

1- مراقبت از پانسمان و در صورت خونریزی
از محل زخم مراجعه به بیمارستان

2- با تشخیص پزشک معالج برداشتن پانسمان
پس از 24 ساعت و شستشوی زخم.

3- مصرف داروهای تجویز شده توسط پزشک
شامل آنتی بیوتیک و مسکن ها.