

آمادگی بیماران سرپایی جهت انجام اسکن با تزریق

❖ در تمامی اسکن ها با تزریق وریدی بیمار از ۸ ساعت قبل ناشتا باشد.

طریقه مصرف ماده کنتراست خوراکی برای انجام اسکن شکم و لگن :

۲ عدد مگلومین را در ۱/۵ لیتر آب معدنی خنک ریخته و ۸ ساعت قبل از آزمون ۳ لیوان میل کنید، ۴ لیوان باقی مانده را ۳ ساعت قبل از اسکن به فاصله هر ۲۰ دقیقه خورده شود. ۱ لیوان از ماده کنتراست را بیمار در موقع حضور در بخش اسکن به همراه داشته باشد.

توجه :

- ❖ بیمار از ۲ هفته قبل از اسکن، رادیوگرافی دستگاه گوارش با سولفات باریم انجام نداده باشد.
- ❖ فاصله بین زمان سی تی اسکن و اسکن ایزوتوب (طب هسته ای) حداقل باید ۴۸ ساعت باشد.
- ❖ در صورت داشتن هرگونه حساسیت دارویی، غذایی و آسم و ابتلا به ایدز، هیپاتیت، سل، بیماری قلبی و عروقی و کلیوی اطلاع دهید.
- ❖ بیماران محترم در روز مراجعه به اسکن اشیا فلزی (گوشواره، گردنبند، سنجاق سر، لباس دارای دکمه، زیپ فلزی، پولک و سنگ دوزی و لباس دارای فلز) نداشته باشد.
- ❖ بیماران محترم در روز مراجعه به سی تی اسکن سوابق پزشکی خود (سونوگرافی، رادیولوژی، سی تی اسکن، ام آر آی، پاتولوژی، آندوسکوپی، طب هسته ای و آزمایشات جدید خون) را همراه داشته باشند.