

۵ - تی تیوپ : به رادیوگرافی با تزریق ماده کنتراست به مجرای کیسه صfra جهت بررسی کیسه صfra مجاری آن بعد از عمل گفتار ممکن شود.

۶ - IVP : یک روش انتخابی برای ارزیابی رادیوگرافیک بیماران مظنون به سنگ مجاری ادراری است و درواقع یک نوع تست X-Ray است که می‌تواند اندازه شکل و موقعیت دستگاه دفع ادرار شامل مجاری ادراری و کلیه ها را نشان دهد.

ج) ماموگرافی : تصویربرداری جهت بررسی و ارزیابی پافت سینه د) دانسیتومتری : اسکن تراکم استخوان آزمونی برای اندازه گیری قدرت و استحکام استخوان های شما می‌باشد.

بیماران خاتم توجه فرمایند اگر حامله هستید یا احتمال حاملگی خود را می‌دهید قبل از انجام آزمون این موضوع را به کارشناس بخش اطلاع دهید.

۹

۳

۱ - بلع باریم : آزمونی است برای نشان دادن مری (لوله ارتباطی بین دهان و معده) و باریم (میل خوراکی) برای بررسی معده و ابتدای روده کوچک (قسمت اول دیودنوم) به کار می‌رود. پزشک شما این آزمون را بنابراین دلایل زیر درخواست کرده است. ناراحتی و یا وجود درد هنگام بلع ناراحتی ناشی از سوء هاضمه یا رفلادس اسید.

۲ - ترانزیت روده : پزشک شما این آزمون را بنابراین دلایل زیر درخواست کرده است: اختلال در حرکت روده ها - سوء جذب تغذیه ای - درد ناحیه تحتانی شکمی.

۳ - باریم انما : پزشک این آزمون را به چند دلیل برای شما درخواست کرده است: نامنظمی در حرکات روده ها - خونریزی از روده و یا درد پایین شکم و...

۴ - یکی از عوارض آبسه های اطراف مقعد فیستول است که به علت سرباز کردن فیستول داخل رکتوم یا به سطح پوست ایجاد می‌شود که یک روش تشخیصی با تزریق ماده حاجب محلول در آب در مسیر فیستول و رادیوگرافی است.

۲

مرکز تصویربرداری سینا ضمن تکریم ارباب رجوع آماده خدمت رسانی در انجام رادیوگرافی های ساده و رنگی به مراجعه کنندگان محترم می‌باشد.

خدمات قابل ارایه :

- الف) رادیوگرافی های ساده
- ب) رادیوگرافی های رنگی
- ۱- مری و معده
- ۲- ترانزیت روده کوچک
- ۳- باریم انما
- ۴- فیستول گرافی
- ۵- تی تیوپ
- ۶- IVP

ج) ماموگرافی
د) دانسیتومتری

الف) رادیوگرافی ساده به گرافی هایی کفته می‌شود که بدون استفاده از ماده کنتراست و در طول روز از اندامهای مختلف بدن می‌توان انجام داد.

ب) رادیوگرافی های رنگی نیاز به ماده کنتراست (آمپول یا پودر) و در حضور مسول فنی بعد از آمادگی کامل انجام می‌گیرد.

۱



تصویر برداری


مرکز آموزشی و درمانی سینما

راهنمای آموزش به بیماران

شماره تماس رادیولوژی ۳۵۴۹۸۲۵۲

اسفند ۱۳۹۶

دو عدد قرص بیزاکودیل
از ناهار مصرف شود .
دو عدد قرص بیزاکودیل
از شام مصرف شود .
قرص های دایمتیکون روز
از ناهار هر یک ساعت دو عدد
جویده شود .
شربت سناگراف را روز
در یک بطری آب معدنی بزرگ حل
شده و بعد از ناهار مصرف شود .



۵

دستورات آمادگی جهت انجام
گرافیهای اختصاصی رادیولوژی
(مقدار دارو توسط کارشناس
فنی در زمان نوبت دهی تعیین می
شود).

- ۱ - قرص بیزاکودیل عدد
 - ۲ - شربت سناگراف عدد
 - ۳ - شیاف بیزاکودیل عدد
 - ۴ - قرص دایمتیکون عدد
- طريقه استفاده : شربت سناگراف را روز از ناهار در یک بطری آب معدنی بزرگ مخلوط کرده و کامل میل فرمایید .
بعد از خوردن آن حداقل لیوان آب مصرف شود .
دو عدد قرص بیزاکودیل از شام مصرف شود .
دو عدد قرص بیزاکودیل از شام مصرف شود .
دو عدد قرص بیزاکودیل از ناهار مصرف شود .

۶

