

## آموزش‌های بدو بستری :

- 1-دستبند شناسایی که به دست غالب شما بسته شده است تا زمان ترخیص نگهداری کنید.
- 2- به علت خطر سقوط از تخت همیشه نرده کنار تخت بالا باشد
- 3-حتماً قبل از خروج از تخت 10 دقیقه در وضعیت نشسته و پاها آویزان باشد. سپس اقدام به خروج از تخت نمایید.
- 4- همراه بیمار باید قبل از انجام هر اقدامی برای بیمار، به پرستار اطلاع دهد.
- 5-درمورد فعالیت و نوع تغذیه از پزشک یا پرستار خود سوال کنید.

## آموزش‌های حین بستری :

به عنوان یک درمان جایگزین پروتئین پلاسما(IVIG)، در بیماران دچار کمبود یا نقص تولید ایمنوگلوبولین هستند، تجویز می‌شود. در این قبیل بیماران با کمبود ایمنی، ایمنوگلوبولین به منظور حفظ و نگهداری سطح آنتی بادی در حد کافی، جهت جلوگیری از عفونت‌ها و ایجاد یک ایمنی غیرفعال توصیه می‌شود. این درمان هر ۳-۴ هفته یکبار داده می‌شود.

5 - 2 روز بعد از تزریق دارو سطوح سرمی

کافی آنتی بادی در بدن ایجاد می‌شود. نیمه عمر

IVIG حدود 3 هفته است.

## عوارض دارویی:

عوارض این دارو اغلب هنگام تزریق ظاهر می‌شود که با تنظیم سرعت و مقدار تزریق، قابل کنترل است. گاهی نیز عوارض در 3 روز اول بعد از تزریق دیده می‌شود.

شایع ترین عارضه سردرد است. تب، لرز، سرگیجه، خارش، سرفه، تهوع و استفراغ، درد شکم و پشت، خستگی، بشورات جلدی، تغییرات فشار خون و ... از جمله دیگر عوارض احتمالی این دارو هستند.

در صورت بروز هر یک از عوارض بالا کادر

درمان عوارض را کنترل خواهند کرد همچنین

هنگام تزریق، فشار خون، درجه حرارت و

نبض را چک می‌کنند.



IVIG Treatment

## ایمونوگلوبین یا IVIG

گردآوری: صبا معبودی

کارشناس پرستاری

تایید کننده علمی: اساتید ایمونولوژی آرژری

تاریخ تدوین: مرداد 1403

سایت بیمارستان سینا  
<https://sinahosp.tbzmed.ac.ir>

واحد آموزش سلامت

\* معمولاً تزریق چندین ساعت طول می کشد. دفعات تزریق و نوبت بعدی توسط پزشک تعیین می شود.  
\* کاهش ادرار، افزایش ناگهانی وزن یا ورم پاها، می تواند نشانه ای از واکنش های کلیوی دارو باشد.

\* در صورت وجود درد، تورم، قرمزی یا برآمدگی در محل تزریق در دست یا پا به پزشک اطلاع دهید.

\* ادرار قهوه ای یا قرمز و پوست زرد نشانه های عوارض کبدی دارو است.

### منابع:

داروهای تزریک ایران و دسته بندی داروها، دکتر مصطفی صابر و سید رضا موسوی، چاپ اول، ویرایش چهارم، صفحه: ۲۸۸

زمینه ی روان شناسی سانتراک، جان دلیو سانتراک، ترجمه ی مهرداد فیروزبخت، جلد دوم، چاپ چهارم، صفحه 307

توجهات لازم در استفاده از دارو:

\* IVIG، معمولاً از بازو و از طریق یک رگ، (مانند سرم) به بدن تزریق می شود.

\* دارو باید در دمای 2-8 درجه نگهداری شود. از انجماد آن جلوگیری شود.

\* در هنگام تزریق دمای آن را به دمای بدن می رسانند.

\* باقی مانده را مجدد نمی توان استفاده کرد.

\* به ازای هر کیلو از وزن بدن مقدار مشخصی از دارو استفاده می شود. گاهی اوقات ممکن است دارو را با سرم دکستروز 5% رقیق نمایند ولی با هیچ داروی دیگری مخلوط نمی شود.

\* داروی خریداری شده باید کاملاً شفاف و بی رنگ و بدون وجود رسوب یا ذرات شناور باشد.

\* اندازه گیری حجم ادرار و آزمایشات کلیوی (Bun, Cr) مرتب انجام شود.