

آموزش‌های بدو بسته :

1- دستبند شناسایی که به دست غالب شما بسته شده است تا زمان ترخیص نگهداری کنید.

2- به علت خطر سقوط از تخت همیشه نرده کنار تخت بالا باشد.

4- حتماً قبل از خروج از تخت 10 دقیقه در وضعیت نشسته و پاهای آویزان باشد. وسیس اقدام به خروج از تخت نمایید.

5- جهت پیشگیری از عفونت، شستشوی دست و بهداشت فردی رعایت شود.

6- همراه بیمار باید قبل از انجام هر اقدامی برای بیمار، به پرستار اطلاع دهد.

7- نام پزشک خود را بدانید و نام پرستار خود را در هرشیفت بپرسید.

8- در مورد فعالیت و نوع تغذیه از پزشک یا پرستار خود سوال کنید.

آموزش‌های حین بسته :

آموزش‌های قبل از عمل:

1- شب قبل از عمل جراحی حمام کنید.

2- به دلیل امکان تهوع و استقراغ بعد از عمل، از شب قبل از عمل ناشتا بمانید.

3- زمان رفتن به اتاق عمل زیورآلات، دندان مصنوعی یا هر نوع عضو مصنوعی دیگر را از

6. بعد از جراحی، طبق دستور پزشک ورزش انجام دهید.

7 تا زمانی که درن ها و بخیه ها برداشته نشده اند مواد خوشبوکننده و ضد عرق استفاده نکنید.

8- مجاز به انجام تزریقات، و گرفتن خون و کنترل فشار خون در بازوی طرف مبتلا نیستند.

9- تا زمانی که تورم از بین برود و زخم ناحیه بهبود یابد از سوتین و پروتز استفاده نشود.

10- لباس تنگ نپوشید و از جواهرات و کیف دستی در بازوی طرف مبتلا استفاده نکنید.

11- انجام فعالیت های خود مراقبتی مثل مسوک زدن، شستن صورت، شانه کردن از نظر جسمی و روانی اثر درمانی دارد.

12- عموماً بیمار باید از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید.

13- تورم موقت در اندام مبتلا در طی دوره بهبودی شایع است و این افراد باید بازوی خود را بالاتر از سطح قلب به مدت 45 دقیقه، سه بار در روز قرار دهند.

بدن خود جدا کنید. آرایش و لاک ناخن نداشته باشید.

4- در صورتیکه آسپرین، وارفارین یا داروهای کنترل کننده قند خون و فشار خون مصرف می کنید، حتماً به پزشک و پرستار اطلاع دهید.

5- هر نوع بیماری یا حساسیت دارویی و یا سابقه جراحی قبلی خود را به پزشک و پرستار بخش اطلاع دهید.

6- در صورت مصرف سیگار و یا هر نوع ماده مخدر دیگر به پزشک و پرستار بخش اطلاع دهید و از 24 ساعت قبل از عمل از مصرف سیگار خودداری کنید.

مراقبتهاي بعد از عمل:

1- بعد از عمل چیزی نخورید تا پرستار اجازه دهد.

2- پس از جراحی وجود سوزش، درد گلو و تهوع، درد ناحیه عمل امری طبیعی است و در صورت تهوع سر را به یک طرف بچرخانید تا ترشحات معده به حلق راه نیابد.

3- سرفه و تنفس لب غنچه ای خطر عفونت ریوی را به حداقل کاهش میدهد. دهان خود را بسته، از طریق بینی یک نفس عمیق کشیده و با 2 شماره بازدم را با دهان باز انجام دهید.

4- در هنگام سرفه حتماً ناحیه جراحی را توسط دست حمایت کنید.

5- بعد از عمل برداشتن سینه، بیمار با درن مرخص می شود و درن 3 تا 7 روز در محل باقی می ماند.



مرکز آموزشی، پژوهشی و دانشی سینا

ماستكتومی

گردآوری: رحیمه علیزاده
کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

تایید کننده علمی: اساتید جراحی

منبع:

آموزش به بیمار تالیف: ماری ام. کاتابیو و ترجمه دکتر نصیریانی

تاریخ تدوین: مهر 1402
تاریخ بازنگری: مرداد 1403

سایت بیمارستان سینا
<https://sinahosp.tbzmed.ac.ir>

جهت دریافت آموزش‌های لازم و برنامه ویزیت پزشکان
درمانگاه بیمارستان سینا به کاتال تلگرام آموزش سلامت
بیمارستان سینا ملحق شوید
@amuzesh_salamat

واحد آموزش سلامت

- از گرفتن فشار خون ، تزریق و گرفتن خون از دست عمل شده خودداری نمایید.
- در اسرع وقت با جواب پاتولوژی جهت پیگیری سریع و ادامه درمان به پزشک مراجعه نمایید.
- داروهای تجویزی پزشک را به طور مرتب مصرف نمایید.

رژیم غذائی:

- پس از شروع تغذیه هیچ ممنوعیت غذایی ندارید مگر در موارد داشتن بیماری های زمینه ای (دیابت، فشارخون،)
- برای تسريع بهبود رخم از میوه و سبزیجات فراوان و غذاهای پرپروتئین استفاده نمایید و جهت بهبود اشتها غذا را در حجم کم و دفعات زیاد مصرف کنید /برای جلوگیری از بیوست از مایعات فراوان و رژیم پروفایر حاوی سبوس استفاده نمایید.

فعالیت:

- محدودیتی در انجام فعالیت وجود ندارد.
- اما از فعالیتهای سنگین که ممکن است باعث وارد آمدن آسیب به پستان ها شوند خودداری گردد . در صورت انجام جراحی جهت کاهش حس کشیدگی و سوزش در ناحیه زیر بغل و بازو ، ورزشهای دست و بازو را انجام دهید و از بلند کردن اشیاء سنگین خودداری نمایید.

آموزش‌های حین ترخیص

- علائم مهم برای مراجعه فوری به اورژانس یا پزشک معالج:
- بوی نامطبوع یا ترشحات چرکی محل عمل
- درد شدید که به مسکن پاسخ ندهد
- تب و لرز

▪ اختلال دفع ادرار ، مدفوع
▪ علائم شوک (سردی اندام ها، تنفس تند، گیجی)

▪ خونریزی محل عمل

▪ درد و تورم ساق پا

▪ درد قفسه سینه

▪ تنگی نفس و سرفه

مراقبت :

- طبق دستور پزشک روز بعد از ترخیص پانسمان خود را تعویض کنید
- طبق دستور پزشک روز بعد از ترخیص استحمام کنید
- بیمارانی که تورم مداوم دارند می توانند از باند کشی یا آستین های الاستیکی آماده که مچ تا شانه را می پوشاند استفاده کنند
- لوله های وصل شده به شما باید پایین تر از سطح بدن قرار داشته باشد
- بعد از بهبودی کامل رخم 4 – 6 هفته می توان برای افزایش نرمی و حالت ارتجاعی پوست از لوسيون یا کرم استفاده کرد .